

# HyCyte™ C57BL/6 小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化试剂盒

## C57BL/6 Mouse Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells Adipogenic Differentiation Kit

货号: BMMC-D102 规格: 400 mL/Kit

### 产品组分

#### 成脂诱导分化培养基——维持液 Maintenance Medium (200 mL)

试剂盒组分	规格	保存条件	有效期
C57BL/6 BMSCs Adipogenic Differentiation Basal Medium	175 mL	2~8°C, 避光	12 months
C57BL/6 BMSCs Adipogenic Differentiation FBS	20 mL	-20°C	24 months
Penicillin-Streptomycin	2 mL	-20°C	12 months
Glutamine	2 mL	-20°C	12 months
Insulin	400 μL	-20°C	12 months

#### 成脂诱导分化培养基——诱导液 Induction Medium (200 mL)

试剂盒组分	规格	保存条件	有效期
C57BL/6 BMSCs Adipogenic Differentiation Basal Medium	175 mL	2~8°C, 避光	12 months
C57BL/6 BMSCs Adipogenic Differentiation FBS	20 mL	-20°C	24 months
Penicillin-Streptomycin	2 mL	-20°C	12 months
Glutamine	2 mL	-20°C	12 months
Insulin	400 μL	-20°C	12 months
IBMX	200 μL	-20°C	12 months
Rosiglitazone	200 μL	-20°C	12 months
Dexamethasone	200 μL	-20°C	12 months

### 染色液

Dye Liquor: Oil Red O Staining Solution	5 mL	2~8°C, 避光	12 months
-----------------------------------------	------	-----------	-----------

**NOTE:** a. 本产品组分均为无菌分装, 可直接配制成完全培养基使用; 染色液为独立包装组分, 请勿与培养基混用。

b. 配制完全培养基前, 请瞬时离心各管小剂量试剂以免损失, 配制后请在有效期内使用完毕。

c. 完全培养基储存条件: 2~8°C, 避光; 配制后有效期: 3 months。

d. 本产品仅用于科研实验, 不可用于临床治疗。

为科研加速, 为工业赋能!

CRISPR/Cas9细胞基因编辑

载体构建/病毒包装 PDO类器官/动物模型CDX

稳转细胞株 HyCyte™干细胞/原代细胞 HyCyte™培养试剂盒



关注海星公众号



关注海星视频号



## 产品描述

本产品是海星生物专为C57BL/6小鼠骨髓间充质干细胞研制优化的HyCyt™成脂诱导分化培养基试剂盒，用于增强C57BL/6小鼠骨髓间充质干细胞向成脂细胞方向诱导分化的能力。在库产品均通过生物安全检测和产品质量检测，体系稳定有效，现货发送，性价比高。海星生物专业的研发团队可提供最有效的技术指导，保证售后品质。

## 质检标准

pH: 7.2~7.4

内毒素含量: < 10 EU/mL

生物安全: 细菌、真菌、支原体检测阴性

质量检测: 诱导测试合格

## 运输方式

产品冰袋冷藏运输

## 检验原理

油红O染料属于苏丹染料家族的一员，是一种脂溶性的偶氮染料。显色明显便于观察，主要用于脂肪染色。干细胞在诱导培养基的作用下，会逐渐分化成前成脂细胞和脂肪细胞，将形成大小不一的脂滴。油红O在脂肪中的溶解度大于其在染色液中的溶解度，从而使脂肪着色呈现红色或橘红色。

## 使用说明

### 1. 成脂诱导分化操作

#### 1.1 接种干细胞

取对数生长期的细胞，按照  $2.0 \times 10^4 \text{ cells/cm}^2$  的细胞密度接种至培养器皿，于 37°C, 5% CO<sub>2</sub> 培养环境下培养至汇合度 90~100%，弃掉上清，加入成脂诱导分化培养基诱导液。

**NOTE:** 如细胞贴壁性较差，建议使用 0.1% 明胶对培养底面进行包被。

#### 1.2 细胞分化诱导

于 37°C, 5% CO<sub>2</sub> 培养环境下培养约 3 天，更换为成脂诱导分化培养基维持液，培养 1 天后，再更换为成脂诱导分化培养基诱导液，继续培养 3 天。

按照以上换液频率诱导 14~21 天，并注意观察细胞形态变化。根据细胞诱导形成的脂滴数量和大小，决定终止细胞诱导的时间，并进行染色鉴定。

### 2. 染色鉴定

#### 2.1 细胞固定

吸去培养基使用适量 1×PBS 清洗一次，弃去后取适量 4% 中性甲醛溶液覆盖培养器皿底面，室温固定 30~60 min，弃去固定液再使用 1×PBS 清洗两次。

#### 2.2 油红 O 染色

取生理盐水或 1×PBS 与油红 O 原液配制油红 O 工作液（油红 O 原液: 生理盐水 = 3:2），现用现配。配制后可对油红 O 工作液进行离心，以沉淀染色液中的过饱和析出物。向清洗干净的诱导孔内加入适量油红 O 工作液，静置染色 30 min。吸走油红 O 工作液，用 1×PBS 清洗两次，并加入适量 1×PBS 避免细胞干燥。

#### 2.3 诱导评估

显微镜下观察成脂染色效果，并进行图像采集和诱导评估。诱导成功时，脂滴与油红 O 染料结合后呈现红色或橘红色。

**NOTE:** 干细胞的成脂分化水平因细胞类型、细胞供体来源，培养条件、细胞代次、细胞状态和分化时间等因素而异。

科研加速，工业赋能！

CRISPR/Cas9细胞基因编辑

载体构建/病毒包装 PDO类器官/动物模型CDX

稳转细胞株 HyCyt™干细胞/原代细胞 HyCyt™培养试剂盒




关注海星公众号



关注海星视频号





## 相关产品

试剂盒	规格	货号
HyCyte™ C57BL/6 小鼠骨髓间充质干细胞成脂诱导分化试剂盒	400 mL	BMMC-D102-400
	200 mL 即用型	BMMC-D102R

科研加速，工业赋能！

CRISPR/Cas9细胞基因编辑

载体构建/病毒包装 PDO类器官/动物模型CDX

稳转细胞株 HyCyte™干细胞/原代细胞 HyCyte™培养试剂盒



关注海星公众号



关注海星视频号

