


产品使用说明书

人乳腺癌细胞 MDA-MB-436

货号：TCH-C251

规格：1×10⁶ cells/T25 培养瓶



MDA-MB-436 细胞用于探索 BRCA1 相关肿瘤的发生机制和测试治疗策略。

产品说明

细胞名称	人乳腺癌细胞
细胞简称	MDA-MB-436
种属来源	人
组织来源	乳腺
细胞形态	多形
生长特性	贴壁生长
培养体系	培养体系：L-15+20% FBS（胎牛血清） +0.01mg/ml Insulin + 1% P/S 推荐使用海星配套 MDA-MB-436 细胞专用培养基，货号：TCH-G251
消化时间	胰蛋白酶-EDTA 消化液（0.25%）含酚红（胰酶） 在 37°C 消化 2-3min。 注：不同品牌胰酶不同细胞密度消化时间略有区别，以大部分细胞变圆脱落为准。
注意事项	1. 该细胞使用 L15 空气培养基，须将培养箱的二氧化碳浓度调节至“0”（维持空气培养状态）。 2. 没有无空气培养箱，可选择使用不透气培养瓶（密封瓶盖）培养该细胞，并将瓶盖拧紧，操作时开盖短间接触到的二氧化碳不影响该细胞正常培养。
传代比例	1：2-1：3，每 2-3 天换液一次
培养环境	气相：空气，温度：37°C
冻存条件	冻存条件：60%基础培养基+30%FBS+10%DMSO 推荐海星 HyCyte® 一步冻存液（即用型、无血清、无需程序降温），货号：GUCP-R201 保存条件：液氮储存
安全性	所有肿瘤细胞和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性，建议在二级生物安全台内操作，并做好个人防护。
用途	仅供科研使用

MX183A5-20250205

为科研加速，为工业赋能！



海星商城二维码



公众号二维码



人乳腺癌细胞（L-15空气培养）（MDA-MB-436）


货号：TCH-C251 规格：1×10⁶ cells/T25培养瓶

1. 空气培养注意要点：

a) 人乳腺癌细胞（MDA-MB-436）使用**L15空气培养基**。

L-15 采用磷酸盐和游离氨基酸而非碳酸氢钠进行缓冲。这种培养基适用于支持非 CO₂ 平衡环境中的细胞生长。在使用该培养体系时，须将培养箱的二氧化碳浓度调节至“0”（维持空气培养状态），如果通入5%二氧化碳通过培养基对细胞产生毒性。

b) 如您没有无空气培养箱，可选择**使用不透气培养瓶（密封瓶盖）**培养该细胞，并将瓶盖拧紧，每次操作时开盖短间接触到的二氧化碳不影响该细胞正常培养。



图示：密封瓶盖（左）和透气瓶盖（右）

2. MDA-MB-436细胞专用培养基（即用型培养基）：

已添加血清和双抗等成分，可直接用于培养MDA-MB-436细胞。

为科研加速，为工业赋能！



海星商城二维码



公众号二维码

